

Behandling med syrgas vid covid-19

Angående behandling med syrgas vid covid-19 i hemmet, korttidsboende, SÄBO och LSS

Behandling i palliativt syfte

När det gäller lindring av andnöd är det morfin som det idag finns vetenskaplig evidens för. Detta gäller oavsett orsak till andnöd. Tillgängliga metodmässigt starka studier visar ingen skillnad i subjektiv effekt mellan luft och syrgas i de patientgrupper som studerats¹

Patientgruppen det gäller är skör med hög biologisk ålder och ofta betydande samsjuklighet där mycket talar för att de avlider tidigt i förloppet i en stillsam sjukdomsbild och därmed inte hinner utveckla grav ARDS och kraftig andnöd.

Behandling i kurativt syfte

Vid manifest ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) behövs syrgas där höga flöden kan bli aktuella vilket kräver monitorering med upprepade blodgasanalyser. Patienter som ska behandlas i kurativt syfte finns i undantagsfall på SÄBO eller korttidsboende, och eftersom denna vård svårligen kan bedrivas utanför sjukhus kan dessa sålunda inte stanna på sitt boende.

[Regional riktlinje - Förändring i kommunalt basläkemedelsförråd, Region Skåne](#)

Antaget av Förvaltningen Primärvårds medicinska råd 200415.

[¹Cochrane review and meta-analysis by Ekstrom, Ahmadi, Bornefalk-Hermansson, Abernethy, and Currow \(2016\)](#)